

DEBRECENI EGYETEM

University of Debrecen



Universitas Debreceniensis

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI



Nagy Anikó

Magatartástudományi Intézet, Klinikai-
és Egészségpszichológiai Tanszék

**TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI
KONFERENCIA**

2013/14.

PED.2 13:00-14:00 Elnök: Prof. Dr. Kiss Csongor
Boruzs Krisztina

PED.5. Boruzs Krisztina ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SZÜLETÉSI SÚLYPERCENTILEK VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA

PED.6. Kőműves Renáta ÁOK V.
Gyermekegyógyászati Intézet
GYULLADÁSOS FOLYAMATOK, INFRAVÖRÖS EMISSZIÓ INTENZITÁS
MÉRÉSE GYERMEKKORBAN.

PED.7. Miliczki Viktória Rita ÁOK V.
Gyermekegyógyászati Intézet
INTÉZETI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ, KÖZÖSSÉGBEN SZERZETT PNEUMONIA
GYERMEKKORBAN

PED.8. Baranya Erika ÁOK V.
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
EGFR ÉS KRAS MUTÁCIÓK VIZSGÁLATA TÜDŐ ADENOCARCINOMÁBAN

**NEKUNDER PREVENCIÓ: CSALÁDORVOSLÁS, PREVENTÍV
MEDICINA; TERCIER PREVENCIÓ: FIZIOTERÁPIA, REHABILITÁCIÓ,
ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS (PREV2)**

2014. FEBRUÁR 20., 13:15-17:15, BELGYÓGYÁSZATI INT. A ÉPÜLET

PREV2.1 13:15-14:30 Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza
Szöllősi Gergő József

PREV2.1. Szöllősi Gergő József népegészségügyi MSc I.
Fogelző Orvostani Intézet, Biostatistikai és Epidemiológiai Tanszék
A SZÜRESEN VALÓ RÉSZVÉTEL HATÁSA A DIABÉTESZES BETEGEK
KEZELÉSÉRE KÜLÖNBÖZŐ SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK
HATÁSA VÁLTOZÁSÁBAN

PREV2.2. Nagy Anikó egészségpszichológia MSc II.
Magatartástudományi Intézet, Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék
A KODEPENDENCIA KÉRDŐÍV MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS
A KODEPENDENSEK KORAI MALADAPTÍV SÉMÁI

PREV2.3. Vadász Tímea ÁOK VI.
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
ARTHIROSISOS BETEGEK KÖVETÉSE A HÁZIORVOSI PRAXISBAN

PREV2.4. Csarnainé Pálosi Rita ápolás és betegellátás BSc, ápoló szakirány III.
Belgyógyászati Intézet, Reumatológia Tanszék
AZ ÖNINJEKCIÓZÁS EDUKÁCIÓJA BIOLÓGIAI TERÁPIÁVAL KEZELT
GYULLADÁSOS REUMATOLÓGIAI BETEGEKBEN

PREV2.5. Tasi Krisztina ápolás és betegellátás BSc, gyógytornász szakirány IV.
Fizioterápiás Tanszék
HOSSZUTÁVÚ ZENÉS FIZIOTERÁPIÁS TRÉNING PROGRAM IDŐSEK
KÖRÉBEN

PREV2.1. Szöllősi Gergő József népegészségügyi MSc I.

Megelőző Orvostani Intézet, Biostatistikai és Epidemiológiai Tanszék

A SZŰRÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL HATÁSA A DIABÉTESZES BETEGEK TÚLÉLÉSÉRE KÜLÖNBÖZŐ SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK FÜGGVÉNYÉBEN

A diabetes mellitus az egyik legjelentősebb hazai népegészségügyi probléma. Komoly terhet ró az ellátórendszerre, és az életminőséget is nagymértékben befolyásolja, ezért szűrése kiemelt jelentőségű. Viszont nem jól ismert a szűrővizsgálattal és a tünetek alapján felismert esetek prognózisa közötti különbség. Vizsgálatunk célja volt, hogy elemezzük a szűréssel felfedezett, illetve a korábban már diagnosztizált betegek túlélési ideje közötti különbséget. Továbbá szeretnénk volna megbecsülni, hogy az egyes szociodemográfiai tényezők hogyan befolyásolják a rejtett és az ismert diabéteszben szenvedők prognózisát. Kutatásunk adatait a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara által működtetett Házi-Orvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programra épített, 2001-ben elindított Rejtett Morbiditási Vizsgálat szolgáltatta, amelyben 55-64 éves felnőttek egészségi állapotának alakulását követtük házi-Orvosai segítségével. A 2013-ban lezárt adatbázis segítségével értékeltük a diabétesz betegek túlélését többváltozós Cox regresszió segítségével. Elemzésünk során 4273 fő adatait használtuk fel, melyből a házi-Orvosi nyilvántartás alapján 495 ismert és 363 szűréssel felfedezett diabétesz beteget azonosítottak 2001-ben. A diabétesz betegek túlélésére ható szociodemográfiai tényezők közül a kor, a nem és az iskolai végzettség bizonyult szignifikáns befolyásoló tényezőnek. A férfiak rosszabb prognózisát a 2,4-es veszélyhányados (VH) jelezte ($p < 0,001$). A 60-64 évesek túlélése jelentősen rosszabbnak bizonyult a fiatalabb korcsoportéhoz viszonyítva (VH=1,42; $p=0,019$). A képzettség tekintetében a magasabb iskolai végzettség erős protektív faktorként jelent meg (az egyetemi végzettséggel rendelkezők prognózisa lényegesen kedvezőbb volt, mint az alapkülső végzettséggel sem rendelkezőké: VH=0,40; $p=0,005$). A tünetek alapján diagnosztizált és a szűrés során felismert diabétesz beteg túlélési esélye között nem találtunk szignifikáns eltérést (VH=0,78; $p=0,074$). Vizsgálatunk szerint (1) a diabétesz betegek túlélése szempontjából kedvezőtlen prognosztikai faktor az idősebb kor, a férfi nem és a képzetlenség; (2) a szűréssel felfedezett esetek túlélése nem tér el a tünetek alapján felismert esetektől.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031

Témavezető: Dr. Sándor János

PREV2.2. Nagy Anikó egészségpszichológia MSc II.

Magatartástudományi Intézet, Klinikai- és Egészségpszichológiai Tanszék

A KODEPENDENCIA KÉRDŐÍV MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS A KODEPENDENSEK KORAI MALADAPTÍV SÉMÁI

Bevezetés: A társfüggő (kodependens) személy szoros függőségben él egy függőségben vagy más mentális betegségben szenvedő személlyel. A társfüggőség a személy számára komoly szenvedést okoz, szerepet játszik a társ függőségének fennmaradásában. Hazánkban nem áll rendelkezésre a kodependenciát megbízhatóan mérő, magyar nyelvű kérdőív. A kutatás célja a Kodependencia Kérdőív megbízhatóság vizsgálata, majd az egészséges és kodependens személyek gyermekkorából származó maladaptív sémáinak összehasonlítása.

Módszerek: A Kodependencia Kérdőív (Roehling és Gaumond, 1996) magyar változata 36 tételből és 4 alskálából áll. A vizsgálati alminták (egészséges, kodependens) csoportba sorolása a megbízhatóság vizsgálat után rövidített kérdőív segítségével történt. A korai maladaptív sémák a Young-féle Séma Kérdőív rövidített változatával (YSQ-S; Young, 1998) kerültek felmérésre.

Minta: A vizsgálati minta 48 kodependens és 252 egészséges személyből áll (N=300), 121 fő személyes találkozás során, 179 fő interneten keresztül töltötte ki a kérdőívet.

Eredmények: Megbízhatóság vizsgálat: A kérdőív itemeinek szelekciója az alskálák faktoranalízise és a Cronbach-alfa mutató alapján történt. A kérdőív alskálái és a kodependensek korai maladaptív sémái közötti összefüggést a Spearman-féle rangkorrelációval vizsgáltuk. A kapott korrelációs értékek (0,4 fölött) mutatják a kérdőív érvényességét. A rövidített kérdőív megbízhatóbbnak bizonyult, mint a teszt eredeti változata, használata javasolható a klinikai gyakorlatban.

Korai maladaptív sémák összehasonlítása az egészséges és a kodependens csoportban: A kodependens és egészséges személyek között szignifikáns eltérést tapasztaltunk minden maladaptív séma esetén. A társfüggő személyeknél az elhagyatottság, érzelmi depriváció, társas izoláció, behódolás, önfeláldozás, érzelmi gátoltság, könyörtelen mércék sémák érték el a legmagasabb pontszámot. Az eredmények alapján a kodependens személyek több maladaptív sémával rendelkeznek az egészséges személyekhez képest, melyek tükrözik az alapvető fejlődési szükségleteket ki nem elégítő gyermekkor, diszfunkcionális családi környezet hosszú távú leképeződését és a felnőttkorra is átvélő következményeit.

Témavezető: Dr. Kuritárné Szabó Ildikó, Knapék Éva