



24,14%-a használ mindig gumióvszert szexuális kapcsolata közben, 19,40%-a használ orális fogamzásgátló tablettát. A 20 év felettiek 43,11%-a még sohasem volt méhnyakrák szűrésen, viszont 28,44%-a rendszeresen jár. **Következtetések:** A nők hiányos ismeretekkel rendelkeznek HPV fertőzéssel kapcsolatban, szexuális magatartásuk sok esetben nem megfelelő. Bár sokan hallottak a HPV elleni oltásról közel 70%-a még nem oltatta be magát.

14. KALCIUM ÉS KALCIFEROL BEVITELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK TERHES NŐK KÖRÉBEN

Szerző: Vincze Ferenc (DEOEC, Táplálkozástudományi Mesterképzési Szak, I)

Témavezetők: Dr. Sándor János, egyetemi docens, DE, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biostatistikai és Epidemiológiai Tanszék

Magyarországon a reprodukív korú nők átlagos kalciferol (D3) és kalcium (Ca) bevétele kevés (2 µg/nap D3, 710 mg/nap Ca), pedig a megfelelő Ca-bevitel szükséges a magzati csontváz kalcifikációjához, csökkenti az anyai magas vérnyomás kockázatát. A D3 elősegíti a kalcium felszívódását, csökkenti az I-es típusú diabetes későbbi kialakulásának kockázatát az újszülöttnél. Elemzésünk célja a terhes nők Ca és D3 bevitelének felmérése volt, valamint a szocio-demográfiai státusz, illetve az általános egészségmagatartás hatásának vizsgálata e két tápanyag bevitelére. Vizsgálatunkban 308 várandós szombathelyi kismama kérdőívét dolgoztuk fel. Adatok értékelése többváltozós logisztikus regressziós elemzéssel történt. Eredményeinket esélyhányadossal és [95%-os megbízhatósági tartományokkal] jellemeztük. Általunk vizsgált nők 23%-a vitt be megfelelő mennyiségű Ca-ot, illetve 53%-a elegendő D3-t. A felsőfokú végzettségű anyák között 11,35-szor [2,32- 55,43] volt gyakoribb a Ca-hiányos táplálkozás, mint a 6-8 osztályt végzettek között. Felsőfokú végzettségű apák esetében ugyanez az érték 0,10 [0,02-0,54] volt. Akik egyszer vagy egyszer sem nyaraltak, azok közt 2,84-szor [1,24-6,52] volt gyakoribb a Ca-hiányos táplálkozás, mint a gyakran nyaralók csoportjában. Absztinens kismamák esetén 84%-kal volt kisebb a D3-hiányos táplálkozás esélye, mint az alkoholt heti rendszerességgel fogyasztók körében. Vizsgálatunk által leírt magyarországi beviteli adatok beavatkozást tesznek szükségessé. A szupplementációra vonatkozó ajánlásokat is fejleszteni kell. Az intervenció célcsoportjának meghatározásakor eredményeink segítséget jelenhetnek.

XVIII. Tudományos Diákköri Konferencia
2011. március 17-20.
Marosvásárhely

Sesiunea Științifică Studențească, ediția a XVIII-a
Târgu Mureș
17-20 martie 2011

TUDOMÁNYOS TANÁCS

Rektor:
Prof. Dr. Constantin Copotolu

Rektorhelyettesek:
Prof. Dr. Nagy Őrs
Prof. Dr. Klara Brânzanluc

Kancellár:
Prof. Dr. Aurel Nireștean

Elnök:
Prof. Dr. Ioan Nicolaescu

Dékánok:
Conf. Dr. Leonard Azamfirel
Prof. Dr. Mircea Suciu
Conf. Dr. Daniela Muntean

Dékánhelyettesek:
Conf. Dr. Mihaela Oprîș
Prof. Dr. Szabó Béla
Prof. Dr. Kovács Dezső
Conf. Dr. Emese Sipos

Védnökök:

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)
Maros Megyei Tanács

Szervező:

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ)

Elnökség:

Hlavathy Katalin (ÁOK 4), MMDSZ elnök
Benedek Zsolt (ÁOK 3), MMDSZ alelnök
Demeter Ágota (ÁOK 5), MMDSZ alelnök
Máté Hunor (ÁOK 4), MMDSZ alelnök
Szomorú Ildikó (ÁOK 5), MMDSZ alelnök

XVIII. TDK főszervezői:
Bauer Orsolya (ÁOK 5)
Benedek Zsolt (ÁOK 3)
Domokos Edit (ÁOK 6)
Szatmári Tímea (ÁOK 4)

Borító: Spanyol Ádám
Belső borító: Spanyol Ádám
Tördelés: Ráduly Dénes
Marosvásárhely, 2011



Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș

Ro-540095 Marosvásárhely - Târgu Mureș
e-mail: mmdsz@mmdsz.ro
tdk@mmdsz.ro
tel/fax: 0040-365-806856
http://mmdsz.ro
http://tdk.mmdsz.ro