

vemhesség és a szoptatás során kalóriadús (60% zsírkalóriát tartalmazó) táplálékon elhízott (K) vagy normál tápon tartott (N) Wistar-patkányok posztnatálisan zsírdús vagy normál táplálású hím utódaiban (rendre KK, NK vagy KN, NN) mértük a táplálékfelvételt és testtömeg hosszú távú fejlődését, valamint felnőtt korukban indirekt kaloriméterrel (Oxymax) a nyugalmi anyagcsere mértékét (oxigénfogyasztás), illetve FeedScale automatizált táplálékfelvétel-mérő rendszerben intraperitoneális CCK-injekció (5 µg) hatását 48 órás éhezés által kiváltott 2 órás táplálékfelvételre. **Eredmények:** A posztnatális zsírdús diéta hatására az utódok elhíztak, és nyugalmi anyagcserejük alacsonyabb volt. Ugyanakkor zsírdúsán táplált anyák utódai a posztnatális diétától függetlenül kezdetben alacsonyabb testtömegfejlődést és magasabb nyugalmi oxigénfogyasztást mutattak. Az anyai zsírdús diéta középkorú utódokban csökkentette a CCK anorexigén hatását, amely hozzájárulhatott ahhoz, hogy a KK utódok 5 hónapos koruk után viszont gyorsabban elhíztak, mint az NK csoport. **Összefoglalás:** Az anyai zsírdús diéta növeli az utód nyugalmi anyagcserejét, és kezdetben csökkenti a testtömegfejlődés ütemét is. Ugyanakkor csökkenti a CCK hatékonyságát, ami zsírdús posztnatális diétán hosszú távon hozzájárulhat a felnőttkori elhízás fokozódásához.

14. A SEJTMEMBRÁN VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOFIZIKAI MÓDSZEREKKEL GAUCHER-KÓRBAN

STUDIUL MODIFICĂRII MEMBRANEI CELULARE CU METODE BIOFIZICE ÎN BOALA GAUCHER

INVESTIGATION OF CHANGES IN CELL MEMBRANE WITH BIOPHYSICAL TECHNIQUES IN GAUCHER'S DISEASE

Szerzők: Soltész Lilla (DE, ÁOK 4)

Témavezetők: prof. dr. Nagy Péter egyetemi tanár, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, DE; dr. Batta Gyula egyetemi adjunktus, Humángenetikai Tanszék, DE

Bevezetés: A Gaucher-kór egy lizoszomális tárolási betegség, amelyben a glükocerebrozidáz hiányának következtében az enzim szubsztátja felhalmozódik a sejtekben. Mivel a tünetek súlyossága sem az enzimhiányt okozó mutációk típusaival, sem a reziduális enzimaktivitás mértékével nem mutat szoros összefüggést, valószínűsíthető, hogy a felhalmozódó szubsztáton kívül más tényezők is hozzájárulnak a tünetek kialakulásához. **Célkitűzések:** Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy a szubsztát megváltoztatja-e a membrán biofizikai tulajdonságait. **Módszerek:** A Gaucher-kór modellezéséhez a THP-1 monocytasejt vonalat használtuk, melyből PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate) segítségével makrofágokat differenciáltunk, és az enzimhiány létrehozására egy enziminhibitorral (CBE, konduritol-B-epoxid) kezeltük

a sejteket. Fluoreszcens lipidanalógok vagy GFP-vel fuzionált membránfehérjék mobilitását FRAP (fluorescence recovery after photobleaching) módszerrel mértük. **Eredmények:** Az FRAP-mérések szerint a fluoreszcens lipidanalógok diffúziója lassult, immobilis frakciója pedig 17%-ról 73%-ra nőtt. Míg a lipidutajban található, GPI- (glikozil-foszfatidil-inozitol) horganyzott GFP esetén nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést, addig a transzmembrán fehérjék viselkedését modellező ErbB2-GFP esetében a diffúziós állandó kb. ötödére csökkent a Gaucher-kóros modellsejtekben. A lipidutaj részét képező lipidek esetén (Bodipy-GM1) szintén nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget. **Következtetés:** Eredményeink arra utalnak, hogy a Gaucher-kórban a plazmamembrán rigidebbé válik, és a nem kizárólag lipidutajban elhelyezkedő membránkomponensek mobilitása csökken. Megfigyeléseinket szeretnénk Gaucher-kóros emberek véréből izolált sejteken is ellenőrizni.

15. A B2-INTEGRINEK ÉS FC-RECEPTOROK SZEREPE A MONONÁTRIUM-URÁT KRISTÁLY ÁLTAL KIVÁLTOTT SEJTAKTIVÁCIÓBAN

ROLUL INTEGRINELOR B2 ŞI AL RECEPTORILOR FC ÎN ACTIVAREA CELULARĂ INDUSĂ DE CRISTALE DE URAT MONOSODIC

THE ROLE OF B2-INTEGRINS AND FC-RECEPTORS IN MONO-SODIUM-URATE CRYSTAL INDUCED CELL-ACTIVATION

Szerző: Tordai Csongor (SE, ÁOK 4)

Témavezetők: dr. Futosi Krisztina egyetemi tanársegéd, Élettani Intézet, SE; prof. dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, Élettani Intézet, SE

Bevezetés: Az urátkristályok lerakódása az ízületekben és az ahhoz közeli szövetekben rohamokban jelentkező gyulladásos betegség, a köszvény kialakulásához vezet, melynek körlefolyásában elengedhetetlenek a veseszűletett immunrendszer fagocitasejtjei. Korábbi eredményeink alapján az Src-típusú tirozin-kinázok esszenciális szerepet játszanak az urátkristály által kiváltott fagocitasejt-aktivációban. Jelen munkánk során a jelátviteli folyamatok proximális szereplőinek: a sejtfelszíni Fcy-receptoroknak és a β2-integrineknek a szerepét vizsgáltuk a fagocitasejt urátkristály-mediált jelátviteli folyamataiban. **Módszerek:** Kísérleteinkhez Fcy-receptor-hiányos (FcRγ-/-), β2-integrin-hiányos (CD18-/-), valamint mindkét molekulára nézve génhányos (FcRγ-/- CD18-/-) egerek felhasználásával csontvelői kimerákat hoztunk létre. A kimerák csontvelői kimosását követően neutrofil granulocitákat izoláltunk. Az urátkristállyal aktivált fagocitasejtek reaktív oxigén-gyök-termelését luminometriásan, a citokintermelést ELISA módszerrel, az intracelluláris fehérjék foszforilációját Western-blot technika segítségével követtük nyomon. A sejtek fagocitózisát