

ISSN 1453-0953

Orvostudományi Értesítő

2016, 89. kötet, 2. különszám

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya

XXVI. Tudományos Ülésszak

Összefoglaló kötet

Marosvásárhely
2016. április 20-23.

Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadó
Kolozsvár



Támogatás: Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya és Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara, 63/2015/P.2/EMEOGYSZ

**PLURIVASZKULÁRIS ÉRÉRINTETTSÉG
KRÓNIKUS OBLITERATÍV ARTERIOPÁTIÁS
BETEGANYAGON**

Afectare plurivasculară la pacienții cu arteropatie obliterantă cronică
Chronic obliterative arterial disease - plurivascular affection

**Kelemen Piroska¹, Kolbert Beáta-Katalin²,
Kelemen Hanga¹**

¹Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika, ²Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház, 2. sz. Belgyógyászati Klinika

A krónikus obliteratív arteriopátia jelentőségét a kardiovaszkuláris megbetegedések magas morbiditása és mortalitása határozza meg.

Célunk, hogy különböző etiológiájú krónikus arteriopátiás beteganyagon tanulmányozzuk a társuló koronária és karotis érintettséget.

Dolgozatomban 177, a 2-es számú Belgyógyászati Klinika 2012-2015 között bennfekvő betegeinek adatait dolgoztuk fel. Tanulmányoztuk a perifériás érintettség, valamint a társuló koszorúér és karotis érintettség gyakoriságát és súlyosságát.

Az ereket CW Doppler, Doppler Duplex ultrahang és érfestéses vizsgálatokkal tanulmányoztuk.

Az adatok feldolgozására GraphPad, MedCalc és IBM SPSS statisztikai módszereket alkalmaztuk.

A tanulmányozott beteganyagban teljes elzáródást gyakrabban ateroszklerózisban, míg többszörös szubokkluzív szűkületet diabéteszes betegeknél találtunk.

Perifériás artériák közül a leggyakrabban érintett ér a bal a. femoralis superficialis volt diabéteszes (68,3%) és nem diabéteszes ateroszklerózisban (66,23%) egyaránt, trombangiitisben pedig a jobb a. tibialis anterior (47,6%).

Koronáriák szintjén ateroszklerózisban az a. descendens anterior (67,53%), diabéteszben (62%) és trombangiitisben (42,85%) az a. circumflexa érintettségét találtuk gyakrabban.

A karotis erei közül a bal a. carotis communis volt leggyakrabban érintett: (ateroszklerózisban 45,45%, trombangiitisben 38%). A diabéteszes csoportban a bal a. carotis communis és mindkét oldali a. carotis interna egyenlő arányban (41,77%) volt érintett.

Következtetésünk, hogy a diabéteszes és nem diabéteszes ateroszklerózisban obliteratív arteriopátia valamint a trombangiitis obliterans plurivaskuláris megbetegedés, ezért az arteriopátiás betegeknél keresni kell a koronária és karotis érintettséget, amely meghatározza a betegség prognózisát.

**TRANSZKULTURÁLIS PSZICHIÁTRIA:
ALKOHOLBETEGSÉG, MIKROEPIDEMIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK BRAUNSCHWEIG-BAN, 2015-
BEN**

Psihiatrie transculturală: cercetări microepidemiologice ale alcoolismului, Braunschweig, 2015
Transcultural psychiatry: microepidemiological research on alcoholism, Braunschweig, 2015

Kerekes Medárd Ferenc

Magánrendelő; Braunschweig, Németország

A MOGYE-en 1986-ban végzett szerző megvizsgálta a németországi Braunschweig-ban 2012 decembere óta működő, pszichiátriai-pszichoterápiás magánrendelésének a 2015-ös évben kezelésben lévő alkoholbetegeit. A 113 páciens ismertebb epidemiológiai paraméterek szerinti csoportosításán túl, dolgozatában kiter a fontosabb transzkulturális jellegzetességekre, a farmako- és pszichoterápiás reagibilitás lényegesebb kérdéseire. Kihangsúlyozza a nyugat-európai addiktológiában egyre elfogadottabb paradigmaváltást, miszerint már nem tekintik a sikeres alkoholbeteg-kezelés legfőbb, elengedhetetlen kritériumának a teljes absztinenciát. A páciensek a szerző saját alkoholológiai nomenklatúrája (genuin, orálneurotikus és disztímiás alkoholbetegek) szerinti bontásban is szinoptikus bemutatásra kerülnek.

**GÓCOS MANIFESTÁCIÓ GYERMEKKORI
HEVENY LEUKAEMIÁKBAN, 3 ESET
TANULSÁGAI KAPCSÁN**

Manifestări focale în leucemiile acute ale copiilor – pe marginea unui număr de 3 cazuri
Focal manifestation of childhood acute leukaemias based on 3 cases

**Kereskai László¹, Benedek Noémi², Vojcek Ágnes²,
Ottóffy Gábor²**

¹Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kórbonctani Tanszék, ²Gyermekgyógyászati Klinika

Jelen dolgozat kapcsán a gyermekkori heveny leukaemiák diagnosztikus nehézségeire és a betegség szokatlan, kezdetben gócos manifestációjának lehetőségére hívjuk fel a figyelmet.

3 beteg esetbemutatása kapcsán elemezzük a klinikai manifestációk sokágú, gyakran nem-specifikus jellegét és a patológiai diagnózis nehézségeit, valamint a megfelelő, szükség esetén ismételt csontvelő minta vétel fontosságát.

Egy 3 éves, heveny myeloid leukaemiás, egy 11 éves, akut lymphoblastos leukaemiás lány és egy 8 éves, Burkitt lymphomás/leukaemiás fiú gyermek eseteit ismertetjük. Mindhárom esetben jelen voltak olyan tünetek, melyek a heveny leukaemia diagnózisát kérdésessé tették. A diagnózis fellátásához multiplex mintavételekre és adiciós, részben molekuláris vizsgálatokra volt szükség.

Mindhárom gyermek betegségének felderítéséhez szükség volt a klinkus kollégák széles körű együttműködésére, többszöri konzultációkra és megfelelő minőségű és mennyiségű, szükség esetén