
A-0222 A mensicus sérülések ellátásának fejlődése, osztályunk tevékenysége során (Referátum)

Abkarovits Géza, Schandl Károly, Karászi Péter, Vaszilkó Péter, Loósz Lőrinc
Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Székesfehérvár
10 perc

A-0204 Lateralis meniscus gyök szakadások kezelési lehetőségei

Lukács Ákos, Szilágyi Zoltán, Biró Csaba
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Traumatológia Osztály, Szombathely
6 perc

A-0203 Medialis meniscus gyök szakadással szerzett tapasztalataink

Lukács Ákos, Szilágyi Zoltán, Biró Csaba
Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Traumatológia Osztály, Szombathely
6 perc

A-0012 Elülső keresztszalag pótlást követő meniscus sérülések előfordulása sportolóknál

Horváth Ádám, Papp Csenge, Novográdecz Gergely, Mintál Tibor
PTE ÁOK Ortopédia Klinika
6 perc

Bevezetés: Sportolók körében az elülső keresztszalag-szakadás incidenciája növekvő tendenciát mutat, napjainkra ezen szalag rekonstrukciója vált az egyik leggyakrabban elvégzett műtétté a mozgásszervi sebészetben. A szalagpótlást követően a stabilitás csökkenhet, ennek következtében fokozódhat a másodlagos sérülések - a meniscus szakadás és az elülső keresztszalag (LCA) graft sérülés, elégtelenség - veszélye, mely tovább nehezíti a sportolók számára a sérülés előtti szintre való visszatérést.

Módszerek: Retrospektív vizsgálat során a klinikánkon 2016 és 2024 között elülső keresztszalag pótláson átesett pácienseket néztük át, hogy milyen gyakorisággal fordult elő, a szalag plasztikát követően meniscus ruptúra, graft szakadás.

Eredmények: Összesen 226 elülső keresztszalag pótláson átesett beteget vizsgáltunk, közülük LCA pótlás után 23 esetben meniscus szakadás, illetve egyéb sérülés következett be. A sérültek közel 80%-a hivatásos vagy amatőr sportoló volt.

Következtetés: Klinikánkon az elülső keresztszalag pótlást követő meniscus sérülések előfordulási aránya a nemzetközi irodalomban szereplő arányokkal megegyező.

Eredményeink felvetik a kiegészítő, nagyobb, főleg rotációs stabilitást biztosító műtéti eljárások bevezetésének szükségességét, különösképpen a hirtelen irányváltást igénylő sportágakban előforduló keresztszalag-sérülések ellátása során.

A-0149 Processzált porc allografttal történt fokális hyalinporc defektus operatív ellátásának hosszútávú utánkövetése humán modellben

Váncsodi József, Bárdos Tamás, Veit Máté
PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
6 perc

A-0129 Szeptikus szövődmény meniscus varrat után?!

Vukov Ádám¹; Tihanyi Dávid¹; Varga Marcell¹

¹Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ

6 perc

A-0022 Elülső keresztszalag reinzercióval kapcsolatos szakmai dilemmák és technikai nehézségek-64 beteg, és két év tapasztalata alapján

Varga Marcell - Domokos Bence - Andaházy Bence - Kiss Ádám - Tihanyi Dávid - Vukov Ádám

Manninger Jenő Baleseti Központ , III-as Mozgásszervi és Gyermektraumatológiai Osztály

6 perc

A-0023 Elülső keresztszalag reinzerció és iliotibialis grafftal való „over the top “ augmentáció élsportoló kamasz gyermekek esetén-esetbemutatás

Varga Marcell - Pék Emese - Czene Dávid

Manninger Jenő Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály

6 perc

A-0134 Utókezelés elülső keresztszalag- szakadás reinzerciót követően gyermekeknél és kamaszoknál -Csökkenthető-e a rehabilitációs idő a pótláshoz képest?-

Farkas Katalin, Varga Marcell, Kassai Tamás, Tóth Krisztina, Szórádiné Vadász Andrea
Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ

6 perc

A-0043 A sterilizálás fajtája és a tárolás hosszának elemzése ín allograftokon

Pap K^{1,3}, Karácsony A³, Kocsis K², Vásárhelyi G², Kiss R⁴

¹Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Klinika ²BIK, Ortopédiai Osztály ³Budapesti Uzsoki utcai Kórház, Ortopédiai-Traumatológiai Osztály ⁴BME

6 perc

A-0067 Posztoperatív rehabilitációs protokollok összehasonlítása elülső keresztszalag pótlással kombinált meniscus varratok után

Pelyva Balázs, Boda Tamás, Pócs Levente

Bács-Kiskun megyei Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti osztály,

6 perc

Diszkusszió

